



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان

دانشکده پزشکی

پایان نامه درجه دکترای پزشکی عمومی

عنوان پایان نامه

**بررسی فراوانی تشخیص نهایی علل درد حاد شکم در زنان 15 تا 45 سال بستری شده در
اورژانس مرکز آموزشی و درمانی آیت الله موسوی زنجان در سال 1400**

استاد راهنما:

دکتر پیمان فتحی پور

اساتید مشاور:

دکتر فرزانه احمدی

دکتر علیرضا زراعتچی

نام دانشجو:

پویا اردشیری

کد پایان نامه: ۱۳-۱۲۳۲-۱۱ A سال تحصیلی: ۱۴۰۲

چکیده

مقدمه: طیف گسترده‌ای از بیماری‌ها، اعم از بیماری‌های خودمحدود شونده تا بیماری‌های تهدیدکننده حیات، می‌توانند منجر به بروز درد شکم حاد گردند. بنابراین شناسایی شایع‌ترین و مهم‌ترین علت‌های درد شکم حاد منجر به تشخیص دقیق و سریع، مدیریت بهتر بیماری و کاهش مرگ و میر می‌گردد. مطالعه حاضر به بررسی علت‌های درد حاد شکم در زنان جوان می‌پردازد.

روش مختصر اجرا: در این مطالعه مقطعی، به طور تصادفی سیستماتیک پرونده 199 نفر از زنان 15 الی 45 ساله که با شکایت درد حاد شکم در اورژانس بیمارستان آیت‌الله موسوی زنجان در سال 1400 بستری شدند و تشخیص اولیه و نهایی مشخص داشتند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافی سن، بیماری زمینه‌ای، سابقه جراحی‌های قبلی، وضعیت نهایی در اورژانس شامل ترخیص از اورژانس، بستری در بخش، انتقال به اتاق عمل و یا فوت بیمار و تشخیص اولیه و نهایی جمع‌آوری شد. تحلیل با نرم افزار SPSS ویرایش 26 و آزمون کی-دو انجام شد.

نتایج: میانگین (انحراف معیار) سن زنان 30/48 (8/34) که اکثریت (38/2 %) در بازه 26-35 سال بودند. 78 نفر (39/2 %) دارای بیماری زمینه‌ای و 88 نفر (44/2 %) سابقه جراحی قبلی داشتند، که از این تعداد اکثریت سابقه سزارین (28/1 %) و آپاندکتومی (6/5 %) داشتند. علت‌های جراحی درد حاد شکم با 96 مورد (48/2 %) بیشترین علت مراجعه بیماران به اورژانس را به خود اختصاص داد. شایع‌ترین علت‌های جراحی: 63 مورد (65/6 %) آپاندیسیت، 11 مورد (11/5 %) کله سیستیت، 5 مورد (5/2 %) کله لیتیاژیس و 2 مورد (2/1 %) انسداد روده بودند. علل زنان و زایمان شامل 42/7 %، داخلی 5/5 % و اورولوژی نیز 4/5 % بود. 84 نفر (42/2 %) در بخش‌های بیمارستانی بستری شدند، 19 نفر (9/5 %) ترخیص گردیدند و 96 نفر (48/2 %) به اتاق عمل انتقال یافتند. در 138 نفر (69/3 درصد)، تشخیص اولیه و نهایی با یکدیگر همخوانی و مطابقت داشتند، به طوری که بالاترین میزان تطابق تشخیص اولیه و نهایی (82/3 %) در بیماران با علت جراحی درد حاد شکم و کم‌ترین میزان تطابق (36/4 %) در بیماران با علت داخلی بود.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات: شناسایی شایع‌ترین و مهم‌ترین علت‌های درد حاد شکم در زنان جوان و تدوین سیاست‌ها و اقدامات درمانی لازم جهت مدیریت بهتر بیماری، می‌تواند در بهبود علائم و افزایش کیفیت زندگی این افراد موثر باشد.

کلیدواژه‌ها: درد حاد شکم، تشخیص اولیه، تشخیص نهایی، زنان، دیپارتمان اورژانس